



## ARSAMA III

### Introduction de la cuniculture dans la préfecture de Mali

**Fiche technique : Résultats intermédiaires par rapport au croisement des animaux guinéens (Race Commun = RC) et sénégalais (Race Commun Sénégalais = RCS)**

#### Quatrième génération (Juin - Juillet 2013)

##### a) Données sur les parents

Nom de l'animal	Sexe	Origine	Age actuel (fin Juin/début Juillet 2013)	Première reproduction	Nombre de lapereaux / mise bas (nombre de mort)
Fodé (RCS)	Masculin	Sénégal (Ziguinchor)	8 à 9 mois	Non	-
Fanta (RC)	Féminin	Guinée (Conakry)	8 à 9 mois	Non	8 (2)


Taux de mortinatalité  
**25 %**

Taux de mortalité au moment du sevrage  
**0 %**

##### b) Données sur les lapereaux

Code (Série F)	Date de naissance	Phénotype anormal	Poids en gr. au moment du sevrage (30 <sup>ème</sup> jour)	Etat de santé au moment du sevrage (02.07)
F01	03.06.13	Non	315	OK
F02	03.06.13	Non	370	OK
F03	03.06.13	Non	295	OK
F04	03.06.13	Non	425	OK
F05	03.06.13	Non	360	OK
F06	03.06.13	Non	385	OK

358  
(Moyen)



**c) Données par rapport à l'alimentation**

Produit frais utilisé	Degré de disponibilité dans la zone d'intervention entre début Juin et début Juillet 2013 (+++ = haute disponibilité /++ = moyenne /+ = faible)	Approvisionnement régulière (produit fourni chaque jour)	Utilisation de suppléments vitaminiques
Choux	+++	Oui	Oui (mélangé avec l'eau)
Carotte	++	Oui	
Concombre	++	Non	
Tomate	++	Non	
Salade verte	+	Non	
Feuille de patate ( <i>Ipomoea batatas</i> )	+	Oui	
Produit sec utilisé			
Aliment complet (fabrication au Sénégal/transport du sac de 50 kg à partir Dakar)	+++	Oui	

**d) Phénotype** (Centre de reproduction à Mali Centre, 3 lapereaux de Fodé et Fanta, Code : F03 - F05)



**e) Données référentielles publiées par ARSAMA III en Juin 2013 (troisième génération)**

Taille moyenne de portée (Fin Juin 2013)	Taux moyen de mortalité	Poids moyen d'un lapereau à 30 jours
7,5 (lapereaux)	40 % (taux de mortalité enregistrés à la naissance)	396 (en gramme)