



ARSAMA III

Introduction de la cuniculture dans la préfecture de Mali

Fiche technique : Résultats intermédiaires par rapport au croisement des animaux guinéens (Race Commun = RC) et sénégalais (Race Commun Sénégalais = RCS)

Cinquième génération (début Juillet – début Août 2013)

a) Données sur les parents

Nom de l'animal	Sexe	Origine	Age actuel (fin Juillet/ début août 2013)	Première reproduction	Nombre de lapereaux / mise bas (nombre de mort)
Issa (RCS)	Masculin	Sénégal (Ziguinchor)	9 à 10 mois	Non	-
Bintou (RC)	Féminin	Guinée (Conakry)	9 à 10 mois	Non	5 (0)


Taux de mortinatalité
0%

Taux de mortalité au moment du sevrage
0%

b) Données sur les lapereaux

Code (Série F)	Date de naissance	Phénotype anormal	Poids en gr. au moment du sevrage (28 ^{ème} jour)	Etat de santé au moment du sevrage (07.08)
G01	11.07.13	Non	455	OK
G02	11.07.13	Non	425	OK
G03	11.07.13	Non	390	OK
G04	11.07.13	Non	395	OK
G05	11.07.13	Non	460	OK

425
(Moyen)



c) Données par rapport à l'alimentation

Produit frais utilisé	Degré de disponibilité dans la zone d'intervention entre début Juillet et début août 2013 (+++ = haute disponibilité /++ = moyenne /+ = faible)	Approvisionnement régulière (produit fourni chaque jour)	Utilisation de suppléments vitaminiques
Choux	+++	Oui	Oui (mélangé avec l'eau)
Carotte	++	Oui	
Concombre	+	Non	
Tomate	++	Non	
Salade verte	+	Non	
Feuille de patate (<i>Ipomoea batatas</i>)	++	Oui	
Produit sec utilisé			
Aliment complet (fabrication au Sénégal/transport du sac de 50 kg à partir Dakar)	+++	Oui	

d) Phénotype (Centre de reproduction à Mali Centre, lapereau de Issa et Bintou, Code : G03)



e) Données référentielles publiées par ARSAMA III en fin 2013 (quatrième génération)

Taille moyenne de portée (Début Juillet 2013)	Taux moyen de mortalité	Poids moyen d'un lapereau à 30 jours
8 (lapereaux)	25 % (taux de mortalité enregistrés à la naissance)	358 (en gramme)