



ARSAMA III Introduction de la cuniculture dans la préfecture de Mali

Fiche technique : Résultats intermédiaires par rapport au croisement des animaux guinéens (Race Commun = RC) et sénégalais (Race Commun Sénégalais = RCS)

Deuxième génération (Avril-Mai 2013)

a) Données sur les parents

Nom de l'animal	Sexe	Origine	Age actuel (Fin Mai 2013)	Première reproduction	Nombre de lapereaux/mise bas
Fodé (RCS)	Masculin	Sénégal (Ziguinchor)	6 à 7 mois	Oui	-
Bintou (RC)	Féminin	Guinée (Conakry)	5 à 6 mois	Oui	8


Taux de mortinatalité
0 %

Taux de mortalité au moment du sevrage
0 %

b) Données sur les lapereaux

Code (Série C)	Date de naissance	Phénotype anormal	Poids en gr. au moment du sevrage (28 ^{ème} jour)	Etat de santé au moment du sevrage (25.05)
C01	28.04.13	Non	250	OK
C02	28.04.13	Non	280	OK
C03	28.04.13	Non	240	OK
C04	28.04.13	Non	310	OK
C05	28.04.13	Non	250	OK
C06	28.04.13	Non	280	OK
C07	28.04.13	Non	270	OK
C08	28.04.13	Non	240	OK

265
(Moyen)



c) Données par rapport à l'alimentation

Produit frais utilisé	Degré de disponibilité dans la zone d'intervention entre début Avril et Fin Mai 2013 (+++ = haute disponibilité /++ = moyenne /+ = faible)	Approvisionnement régulière (produit fourni chaque jour)	Utilisation de suppléments vitaminiques
Choux	+++	Oui	Oui (mêlé avec l'eau)
Carotte	+	Non	
Concombre	+	Non	
Tomate	+++	Non	
Salade verte	++	Non	
Produit sec utilisé			
Résidus de maïs	++	Non	
Aliment complet (fabrication au Sénégal/transport du sac de 50 kg à partir Dakar)	+++	Oui	

d) **Phénotype** (Centre de reproduction à Mali Centre, lapereaux de Fodé et Bintou, Code : C01 (gauche); C04 (droite))



e) Données référentielles publiées par ARSAMA III en Avril 2013 (première génération)

Taille moyenne de portée (Fin Avril 2013)	Taux moyen de mortalité	Poids moyen d'un lapereau à 30 jours
5,00 (lapereaux)	0 % (taux de mortalité enregistrés à la naissance)	337 (en gramme)